



1

Demande à papa



Dans la nature, c'est traditionnellement la femelle qui porte les petits lorsqu'il s'agit de mammifères, qui les couve lorsqu'il s'agit d'ovipares et qui les soigne à leur naissance. Mais certaines espèces dérogent à cette règle. Certains pères jouent en effet le rôle des mères. Chez l'hippocampe par exemple, le mâle est pourvu d'une poche ventrale dans laquelle la femelle dépose ses oeufs, entre 100 et 200 à chaque ponte. L'incubation dure deux à trois semaines; une fois ces petits nés, la même femelle apporte une seconde couvée et le mâle recommence !



Je le crôaa pas !

Le Crapaud accoucheur, qu'on rencontre en France et au Maroc, enroule les oeufs autour de ses pattes arrière. Le soir, il se baigne dans un point d'eau pour les mouiller. Lors d'un de ces bains, au bout de 4 à 7 semaines, les oeufs éclosent et les têtards se dispersent dans l'eau. Le cordon d'oeufs peut mesurer 1,80 mètre de long.



Pic et couve

Certains oiseaux jouent aussi les couveuses. C'est le cas des sansonnets (étourneaux) mais aussi des pics, ces petits volatiles qui martèlent les arbres de leur bec. Ainsi, le mâle pic mineur couve la nuit pour laisser la femelle dormir. Chez le pic épeiche, c'est exclusivement le mâle qui couve.



À savoir

Pour transmettre la chaleur de leur corps aux oeufs pendant la couvée, les oiseaux, mâle ou femelle perdent des plumes sur le ventre, juste après la ponte. Ces zones de peau nue, appelées plaques incubatrices, réchauffent les oeufs.