


CHELONIENS
TORTUES PALUSTRES (CHELIDAE)



- 1 MATAMATA** *Chelus fimbriata* 10 Kg / 30 cm
Dossière brunâtre de faible hauteur, mais composée de plaques cornées tectiformes et creusée de 2 gouttières longitudinales de chaque côté de la carène vertébrale. Plastron jaune pâle, long et étroit à surface lisse. Tête très caractéristique : déprimée, triangulaire, prolongée par une trompe qui lui permet de respirer à la surface de l'eau sans être vu. Gorge plate et rugueuse ornée dans l'arc mandibulaire de 2 barbillons foliés. Quatre autres barbillons très longs se retrouvent sur une ligne transversale post-mandibulaire. Cou robuste, rugueux, orné d'excroissances. Bec mince et petit, coupant mais non dentelé, ni crochus. Pattes robustes et entièrement palmées, armées de griffes épaisses et courbes. Queue courte, conique, sillonnée ventralement. Palustre, principalement aquatique. Se nourrit de poissons et de têtards. Vit dans les criques à courant lent, dans les eaux stagnantes et les marais. Rencontre fréquente. Intégralement protégée en Guyane.



- 2 TORTUE A TETE DE CRAPAUD** *Batrachemys nasuta* 1 Kg / 18 cm
Dossière brunâtre à grisâtre ovale et oblong, plus large postérieurement. Carène centrale en bourrelet arrondi, s'estompant sur la 1ère et la dernière vertébrales. Plastron noirâtre marbré de jaune. Tête cordiforme très grosse. Narines situées à l'extrémité d'une petite protubérance tubulaire. Bec supérieur non denticulé mais échancré au niveau de la région postérieure de l'œil. Zone frontale divisée en nombreuses petites plaques de forme et grandeur. Présence de 2 barbillons au menton grêles et courts. Peau du cou granuleuse mais sans tubercules. Dessus de la tête et du cou brunâtres. Bec et gorge jaune. Membres petits avec doigts entièrement palmés armés de 5 griffes courbes, fines et pointues. Présence de tubercules coniques sur la face postérieure des cuisses. Pieds entièrement palmés et armés de fines griffes recourbées. Queue courte et conique. Biologie peu connue. Palustre, principalement aquatique. Se nourrit de poissons et invertébrés. Vit dans la forêt marécageuse, mares forestières et petites criques. Rare en Guyane. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.



- 3 TORTUE BOSSUE** *Mesoclemmys gibba* 1 Kg / 17 cm
Dossière noirâtre. Contour de la carapace ovalaire, la plus grande largeur étant postérieure. Plastron plat, lisse, brun sombre, et tacheté de jaune. Tête plate, cordiforme, à museau court et arrondi à l'extrémité duquel s'ouvrent de petites narines. Yeux haut situés et bien visibles de dessus. Bec faible et non dentelé. Présence de deux barbillons en arrière de l'arc mandibulaire. Peau du cou granuleuse. Pattes courtes avec une palmure importante dépassant l'extrémité des doigts pourvus de 5 longues griffes fines et pointues à l'avant et 4 à l'arrière. Queue courte, conique, à peau granuleuse. Nocturne et Palustre, principalement aquatique. Se nourrit d'insectes, amphibiens et lombrics. Vit dans les savanes inondées, les marais et crique à court lent. Rare en Guyane, semble dans l'intérieur du département. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.



- 4 PLATEMYDE A TETE ORANGE** *Platemys platycephala* 200 g / 16 cm
Carapace brunâtre à ocre, très plate, à contour pentagonal. Premières marginales. Plastron lisse à plaque intergulaire en blason pentagonal. Tête peu épaisse, cordiforme, à museau pointu et proéminent à l'extrémité de laquelle s'ouvrent de minuscules narines. Zones frontale et occipitale de la tête jaune orangé. Bec petit et non dentelé. Peau du cou rugueuse, hérissée de nombreux petits tubercules durs et coniques. Pattes grisâtres, peu robustes, palmées, couvertes de larges squamelles saillantes et rigides sur les postérieures. Quelques tubercules coniques sur la face postérieure des cuisses. Longues griffes pointues, peu arquées. Queue grise, fine et pointue. Se nourrit d'invertébrés. Nocturne, diurne et palustre, principalement aquatique. Mimétisme de sa tête avec les feuilles mortes. Vit dans les eaux calmes, vaseuses et peu profondes comme les mares forestières temporaires et petites criques. Rencontre peu fréquente en Guyane. Intégralement protégée en Guyane.



CHELONIENS

TORTUES FLUVIATILES (PELOMEDUSIDAE)

TORTUE PALUSTRES (KINOSTERNIDAE ET GEOEMYDIDAE)



- 1 PELTOCEPHALE** *Peltocephalus dumerilianus* 8 Kg / 36 cm
Dossière grisâtre à verdâtre, ovale. Plaques de la carapace imbriquées. Plastron beige entièrement lisse et plat. Tête cordiforme et très grosse. Museau proéminent et arrondi. Six grandes plaques imbriquées recouvrent la tête comme un casque. Présence d'un barbillon mandibulaire court. Bec puissant, peu denticulé, partie supérieure dépassant l'inférieure par une pointe. Peau du cou lisse et gorge jaune. Membres petits. Doigts courts, peu palmés, armés de 5 longues griffes à l'avant et 4 à l'arrière. Grosse queue qui rétrécit en pointe, terminée par un ongle corné. Biologie peu connue. Fluvatile (principalement aquatique). Se nourrit de fruits, poissons et invertébrés. Vit dans les criques, rivières et lacs. Extrêmement rare en Guyane qui semble être sa limite de répartition. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.



- 2 PODOCNEMIDE DE CAYENNE** *Podocnemis cayennensis* 7 Kg / 40 cm
Dossière gris-vert à brun sombre, plate et lisse, de contour subovale tronqué en avant. Plastron clair, brun-rougeâtre. Tête grisâtre avec des taches jaunes, cordiforme à yeux latéraux et proéminents, à museau arrondi où s'ouvrent deux narines très rapprochées. Un barbillon au menton. Pattes grisâtre, largement palmées, armées de griffes courtes. Avant-bras et mains bordés extérieurement d'une frange d'écailles triangulaires disposées en quinconce. Pieds frangés postérieurement de grandes écailles. Diurne, fluvatile et aime se chauffer sur les berges, rochers et souches émergées. Se nourrit de feuilles et fruits. Vit dans les fleuves, rivières et savanes inondées. Rencontre fréquente. Intégralement protégée en Guyane.



- 3 PODOCNEMIDE ELARGIE** *Podocnemis expansa* 35 Kg / 67 cm
Dossière gris-brun voire verdâtre, plate et très large. Plastron grisâtre avec mouchetures jaunâtre. Tête gris-vert, cordiforme à museau pointu. Long cou rétractable. Yeux latéraux, ronds et proéminents. Bec petit. Pattes avec une importante palmure. Peau du cou et des pattes gris jaunâtre. Nocturne, fluvatile et aime se chauffer sur les berges, rochers et souches émergées. Se nourrit surtout de fruits, mais aussi de feuilles et tiges de plantes aquatiques. Très rare en Guyane. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.



- 4 TORTUE SCORPION** *Kinosternon scorpioides* 300 g / 17 cm
Dossière jaune verdâtre à brunâtre, de contour ovale, à plaques cornées imbriquées. Plastron blanc jaune à marron foncé, maculé souvent de sombre. Tête brunâtre à jaunâtre, volumineuse armée d'un bec puissant et crochu, à museau long et arrondi. Pattes robustes entièrement palmées, chaque doigt ayant une longue griffe courbe et pointue. Queue terminée par un ongle corné et crochu. Palustre, aussi bien aquatique que terrestre, nocturne et diurne. Se nourrit d'invertébrés et de poissons. Fréquente les fossés, les marais, les mares forestières, les canaux de drainage, et les polders. Elle aime s'enfoncer dans la boue et les eaux stagnantes. Rencontre occasionnelle sur le littoral, plus rare dans l'intérieur. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.




- 5 TORTUE PONCTULAIRE** *Rhinoclemmys punctularia* 400 g / 18 cm
Carapace brune deux fois plus longue que haute, à contour ovale. Plaques dorsales lisses. Plastron brun noir, plat ou légèrement bombé. Tête plus longue que large à museau long et légèrement ogival, brun noirâtre, ornée de deux bandes discontinues jaune à orange se regroupant pour former un V. Bec fort et peu dentelé. Gorge jaune à gris. Pattes jaune grisâtre, robustes armées de 5 griffes à l'avant et 4 à l'arrière, longues, courbes et pointues. Palmure entre les doigts régulière atteignant les dernières phalanges. Queue courte, fine et pointue. Palustre, principalement aquatique. Se nourrit de feuilles, fruits lombrics et poissons. Fréquente les marais, savanes inondées, criques, forêts et fossés. Commune sur le littoral. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.




CHELONIENS


TORTUES MARINES (CHELONIIDAE ET DERMOCHELYDAE)




1 TORTUE VERTE *Chelonia mydas* 90 Kg / 120 cm
Dossière de couleur uniforme (brunâtre, olivâtre, grisâtre), cordiforme, bombée antérieurement, lisse. Seulement 4 paires de costales. Plaстрon blanc jaunâtre, relativement large, avec 2 crêtes longitudinales chez la juvénile. Tête relativement petite, au museau arrondi. Dessus de la tête et des pattes verdâtre, grisâtre, jaunâtre avec le plus souvent des plaques et écailles lisérées de jaune. Grands yeux en forme d'amande. Large front pariétale précédée d'une petite frontale pentagonale. Bec bien développé, arrondi, finement denticulé. Pattes natatoires aux longs doigts enfermés dans un même tissu. Une griffe unique à chaque patte. Se nourrit de végétaux aquatiques, mollusques et méduses. Côtière et pélagique. Fréquente les eaux dont la température est supérieure à 20° C. Rencontre occasionnelle en Guyane, d'avril à juillet qui vient pondre sur les plages. Intégralement protégée en Guyane.




2 TORTUE OLIVATRE *Lepidochelys olivacea* 42 Kg / 80 cm
Dossière verdâtre à brun, de contour cordiforme, plate en coupe et bossue vers la tête. Plaстрon jaune pâle à blanc, divisé en 2 par 2 crêtes longitudinales Tête de moyenne taille, triangulaire en vue dorsale. Museau court, épais, avec un bec jaune. Pattes natatoires, avec de longs doigts aux antérieures et 2 griffes à chaque patte. Dessus des pattes, cou et tête grisâtre à jaunâtre. Se nourrit de poissons, crustacés, mollusques et algues. Principalement côtière. Fréquente les eaux tropicales à fond rocheux et vaseux. Rencontre fréquente en Guyane, de juin à août qui vient pondre sur les plages. Intégralement protégée en Guyane.








3 TORTUE IMBRIQUEE *Eretmochelys imbricata* 70 Kg / 90 cm
Dossière brun rouge-orangé à noirâtre, ornée de stries jaunes, cordiforme présentant une crête sur la 5^{ème} vertébrale. Plaстрon blanc jaunâtre à doré, parfois sali de brun. Tête plutôt petite, à museau très proéminent et bec supérieur crochu. Pattes recouvertes de grandes écailles, avec 2 griffes à chaque patte. Face supérieure des pattes, de la tête et de la queue brun rougeâtre, avec des écailles lisérées de jaune vif. Gorge blanchâtre. Dessous des pattes et de la queue jaune très pâle, les extrémités des membres tachetées de sombre. Se nourrit d'algues et d'invertébrés marins. Principalement côtière. Fréquente les eaux tropicales riches en rochers et en récifs coralliens. Très rare en Guyane. Intégralement protégée en Guyane.



4 CAOUANNE *Caretta caretta* 70 Kg / 100 cm
Large dossière cordiforme, brun rouge à brun orangé. Généralement 5 paires de costales, les premières en contact avec la précentrale. Plaстрon jaune orangé à brun sombre. Très grosse brun-orangée, avec 4 ou 5 écailles préfrontales. Narines légèrement proéminentes par rapport à l'arrondi du dessus de la tête. Bec jaune doré à brun rouge, puissant, coupant, très peu dentelés. Pattes adaptées pour la nage, avec 2 griffes. Espèce côtière. Se nourrit de crustacés, mollusques et poissons. Rare en Guyane. Intégralement protégée en Guyane.



5 TORTUE LUTH *Dermochelys coriacea* 600 Kg / 190 cm
Pseudo-carapace, bleu sombre à noir, à aspect lisse et brillant, sans plaques, terminée postérieurement par un long éperon. Présence sur la dossière de 5 crêtes longitudinales tuberculées. Tête énorme, triangulaire en vue dorsale. Museau court et large. Bec supérieur robuste encoché de deux "dents". Cou massif. Pattes avant très longues et robustes transformées en rames. Pattes arrière courtes, en palettes natatoires. Pas de griffes. Plaстрon et face inférieure des membres, de la tête et de la queue blanc rosé marbré de sombre. Se nourrit de méduses. Espèce pélagique des eaux chaudes et tempérées. Rencontre fréquente en Guyane, de mai à août qui vient pondre sur les plages. Intégralement protégée en Guyane.



CHELONIENS

TORTUES TERRESTRES (TESTUDINIDAE)



- 1 TORTUE DENTICULEE** *Chelonoidis denticulata* 17 Kg / 50 cm
Dossière très bombée et plastron lisse. Tête allongée à museau arrondi. Pattes robustes en pieds-bots, armées de 5 griffes à l'avant et de 4 à l'arrière, souvent courtes. Arête externe et face antérieure des avant-bras ornées de grandes écailles saillantes et arrondies. Queue courte et pointue. Carapace brun jaune, gris terreux, noirâtre avec chez certains individus une partie centrale de teinte plus claire, ocre à jaune orangé. Pattes et tête brun jaune à grisâtre avec des plaques jaune orangé. Nocturne, diurne et strictement terrestre. Se nourrit de feuilles, fruits, fleurs, termites et parfois des charognes. Fréquente la forêt primaire et la forêt secondaire ainsi que les habitats ouverts comme les abattis et les chablis. Rencontre fréquente et facilement repérable aux bruits qu'elle fait avec les feuilles au sol. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.



- 2 TORTUE CHARBONNIERE** *Chelonoidis carbonaria* 10 Kg / 30 cm
Dossière très bombée, noire pure à brun grisâtre, surface des aréoles lisse, jaune, entourée de sillons effacés puis profonds. Plastron jaune paille voir orangé et tacheté, beaucoup plus long que large, très sillonné sauf vers l'extérieur. Tête brun sombre, noirâtre, ornée de grandes taches jaunes ou rouges, plus longue que large aux yeux peu visibles de dessus. Bec fort et dentelé. Museau bosselé au niveau préfrontal. Ecaïlle frontale petite, irrégulière, précédée d'une préfrontale unique ou divisée. Pattes robustes, ornées de tâche rouge, orangé et parfois jaune, en pieds-bots, armées à l'avant de 5 griffes et de 4 griffes à l'arrière plus ou moins longues et usées. Strictement terrestre et diurne. Se nourrit de fruits, feuilles, fleurs et larves. Vit dans les savanes. Rencontre occasionnelle. Autorisée à la chasse en Guyane, mais interdite au commerce.



CROCODILIENS
CAÏMANS (ALLIGATORIDAE)



- 1 **CAÏMAN NOIR** *Melanosuchus niger* 400 Kg / 600 cm
Plus grand crocodilien d'Amérique du Sud. Face dorsale, noir barré de blanc jaunâtre. Face ventrale unie blanc mat. Cette coloration est nettement marquée chez les juvéniles, reconnaissable au bandes jaunes qui ornent leur flanc noir. Présence d'une crête osseuse entre les yeux. Sur le cou, 4 à 6 rangées de petites écailles sensiblement de même dimension. Yeux marron à gris. Les femelles déposent entre 30 et 50 œufs dans des nids de monticules de débris de végétaux à proximité de l'eau. Nocturne et diurne. Se nourrit de poissons, mammifères, oiseaux et reptiles. Fréquente les eaux calmes comme dans les marais, forêt marécageuse, cours d'eau lents et occasionnellement les estuaires. Rencontre occasionnelle, vit principalement aux marais de Kaw. Intégralement protégé en Guyane.



- 2 **CAÏMAN A LUNETTES** *Caiman crocodilus* 40 Kg / 270 cm
Face dorsale verdâtre avec des bandes noires sur le dos et la queue. Face ventrale unie blanc crème. Présence d'une crête osseuse entre les yeux. Sur le cou 2 rangées d'écailles de dimensions inégales. Yeux verdâtre. Femelle plus petite que le mâle. La ponte, composée de 15 à 40 œufs, est déposée dans des nids fait de monticules de débris de végétaux aux abords des points d'eau. Nocturne et diurne. Se nourrit de poissons, amphibiens et invertébrés. Vit dans différents milieux ouverts comme les marais, les grands plans d'eau, et les cours d'eau importants, ainsi que la mangrove et les fossés. Rencontre fréquente. Autorisé à la chasse en Guyane, mais interdit au commerce.

1



- 3 **CAÏMAN ROUGE** *Paleosuchus palpebrosus* 6 Kg / 180 cm
Plus petit crocodilien du monde. Face dorsale brun rougeâtre avec les flancs barrés de noir. Face ventrale blanc crème maculé de taches noires. Tête rougeâtre. Pas de crête osseuse en les yeux. Présence de 4 écailles dorsales entre les membres postérieurs. Lignes des crêtes dorsales parallèles. Ponte constituée de 12 à 15 œufs déposés dans des nids d'humus, parfois éloignés des points d'eau. Nocturne et diurne. Se nourrit de poissons, lézards et invertébrés. Vit dans une large palette de milieu comme les fleuves, criques forestières, marais, plans d'eau permanents ou temporaires et les fossés. Rencontre fréquente. Autorisé à la chasse en Guyane, mais interdit au commerce.



2



- 4 **CAÏMAN GRIS** *Paleosuchus trigonatus* 20 kg / 230 cm
Face dorsale brun foncé, avec des barres brun jaune sur la queue. Face ventrale blanc crème maculé de taches noires. Peau ossifiée présentant des reliefs particulièrement marqués. Pas de crête osseuse entre les yeux. Présence de 2 écailles dorsales entre les membres postérieurs. Ligne de crêtes dorsales étranglées. Femelle plus petite que le mâle. La femelle dépose 15 à 30 œufs dans des nids d'humus et occasionnellement dans des termitières, parfois loin des cours d'eau. Nocturne et diurne. Se nourrit de petits vertébrés et invertébrés. Vit principalement dans les cours d'eau forestiers. Espèce forestière qui évolue aussi bien sur terre que dans l'eau. Rencontre occasionnelle. Autorisé à la chasse en Guyane, mais interdit au commerce.



3



4